

		NOGENT- MÉTREVILLE. LES-VIERGES.	
		1 ♀	6 ♀
Capacité crânienne.....		1500 ^{cc}	1455 ^{cc}
Circonférence horizontale.....		518 ^{mm}	507 ^{mm}
Diamètres. {	antéro-postérieur maximum....	180	183
	transverse maximum.....	138	133
	basilo-bregmatique.....	139	136
Indices... {	longueur-largeur.....	76,6	72,6
	longueur-hauteur.....	77,2	74,3
	hauteur-largeur.....	100,7	102,2
Diamètres. {	frontal maximum.....	117	114
	frontal minimum.....	99	92
	biorbitaire ext.....	104	99
	bizygomatique.....	130	120
Hauteur face.....		87	82
Indice facial.....		66,9	68,3
Nez..... {	longueur.....	53	48
	largeur.....	22	23
Indice nasal.....		47,1	47,9
Orbite... {	hauteur.....	32	32
	largeur.....	38	36
Indice orbitaire.....		84,2	88,8

*DESCRIPTION D'UNE NOUVELLE ESPÈCE DE TATOU,
TYPE D'UN GENRE NOUVEAU (TOLYPOÏDES BICINCTUS),*

PAR MM. G. GRANDIDIER ET M. NEVEU-LEMAIRE.

Parmi les collections recueillies au cours de la mission de Créqui Montfort et Sénéchal de la Grange dans l'Amérique du Sud, se trouvent deux carapaces de tatous complètement enroulées et peintes par les Indiens avec une couleur jaune orangé et rouge. La tête, les pattes, la queue et tous les organes de l'animal ont été soigneusement enlevés, et il ne reste plus que les deux boucliers scapulaire et pelvien, rattachés l'un à l'autre par les bandes mobiles. La carapace, ainsi nettoyée et enroulée, ressemble à une calebasse.

Cette faculté de s'enrouler en boule que montrent avec évidence les deux exemplaires, n'est connue jusqu'ici que dans un seul genre de tatous, le genre *Tolypterus* Illiger, 1811 (de *τολυπειω* se rouler en boule); aussi ces animaux ont-ils reçu des indigènes le nom de *bolita* (petite boule);

on les appelle aussi *mataco* ; c'est le *Dasypus apar* de Cuvier et le *Tatu bolita* d'Azara.

A première vue, les deux carapaces, dont nous venons de parler, se ressemblent beaucoup, mais si on les examine de plus près, on voit que l'une d'elle possède 3 bandes mobiles, tandis que l'autre n'en possède que 2, sans qu'il y ait aucun artifice de préparation, car, au premier abord, nous avons pensé à une supercherie ou à une anomalie.

Or, l'un des caractères primordiaux du genre *Tolypeutes*, est de présenter 3 bandes mobiles ; aussi l'une de nos carapaces doit-elle être rattachée sans aucun doute à ce genre, probablement au *T. Muriei* ; l'autre, à cause de la présence de 2 bandes mobiles seulement, nous semble devoir rentrer dans un genre voisin, mais différent cependant, et nous proposons pour ce nouveau genre le nom de *TOLYPOÏDES* (de *τολύπη*, peloton, boule, et *ειδος*, apparence).

Ce genre rentrera, avec le précédent, dans une même sous-famille, la sous-famille des *Tolypeutinae*, caractérisée comme il suit :

Carapace composée de 3 boucliers : céphalique, scapulaire et pelvien ; entre ceux-ci, un petit nombre de bandes mobiles.	} <i>Tolypeutinae</i> .. {	3 bandes mobiles. <i>Tolypeutes</i> .
Écailles polygonales, variant de forme suivant la région et presque toutes hérissées de tubercules qui s'émoussent plus ou moins par l'usage.		2 bandes mobiles. <i>Tolypoïdes</i> .
Animaux pouvant s'enrouler en boule.....		

Le genre *Tolypeutes* ne comprend actuellement que 3 espèces :

Tolypeutes tricinctus Linné, 1766.

Tolypeutes conurus Is. Geoffroy Saint-Hilaire, 1847.

Tolypeutes Muriei Garrod, 1878.

Le genre *Tolypoïdes* ne renferme encore qu'une seule espèce, que nous proposons de nommer *Tolypoïdes bicinctus*, pour rappeler son caractère le plus frappant.

***Tolypoïdes bicinctus* nov. sp.**

Bouclier scapulaire.	Longueur médiane.....	67 ^{mm}
	Longueur latérale d'angle à angle.....	75 ^{mm}
	Distance entre les angles antérieurs.....	45 ^{mm}
	Distance entre les angles postérieurs.....	121 ^{mm}
	Largeur en arrière.....	170 ^{mm}
	Nombre de rangées d'écailles.....	8

Bandes mobiles . .	{	Longueur des bandes mobiles	80 ^{mm}
		Nombre de bandes	2
		Longueur de la 1 ^{re} bande	25 ^{mm}
		Largeur de la 1 ^{re} bande	170 ^{mm}
		Nombre des écailles de la 1 ^{re} bande	21
		Longueur de la 2 ^e bande	24 ^{mm}
		Largeur de la 2 ^e bande	175 ^{mm}
Bouclier pelvien . .	{	Nombre des écailles de la 2 ^e bande	20
		Longueur médiane	140 ^{mm}
		Longueur latérale d'angle à angle	79 ^{mm}
		Distance entre les angles antérieurs	121 ^{mm}
		Distance entre les angles postérieurs	35 ^{mm}
		Largeur en avant	190 ^{mm}
		Nombre de rangées d'écailles	16
Épaisseur du corps (diamètre)		13 ^{mm}	
Circonférence du corps roulé en boule		370 ^{mm}	

Une description plus complète de cette nouvelle espèce, ainsi que des figures, paraîtront prochainement dans le Compte rendu général des résultats de la mission de Créqui Montfort et Sénéchal de la Grange dans l'Amérique du Sud.

*ÉTUDES DES ESPÈCES CRITIQUES ET DES TYPES DU GROUPE DES PASSE-
REAUX TRACHÉOPHONES DE L'AMÉRIQUE TROPICALE APPARTENANT AUX
COLLECTIONS DU MUSÉUM,*

PAR MM. A. MENEGAUX ET C.-E. HELLMAYR.

Les collections ornithologiques du Muséum sont très importantes; on peut les évaluer approximativement à plus de cent mille exemplaires, tant montés qu'en peau, en y comprenant l'importante collection de M. Bouchard, à laquelle vient s'ajouter un dernier don de cinq à six mille échantillons non encore pris en charge.

Pour se reconnaître dans une pareille masse de spécimens, il faut des manipulations presque journalières, et pour tenir cette collection à la hauteur de la science, qui progresse toujours, il faut un travail constant de révision. M. le professeur Oustalet, malgré tout son labeur, n'a pu effectuer, en de longues années, qu'une faible partie de ce travail si minutieux.

Avec cette communication, nous commençons la publication d'une série de mémoires concernant la révision des Passereaux trachéophones de l'Amérique qui existent dans les collections du Muséum. Ce grand groupe y est représenté par plusieurs milliers d'échantillons, montés ou en peau, et par de nombreux types rapportés par les grands voyageurs de la première moitié du siècle dernier (D'Orbigny, Castelnau, Deville, Auguste Saint-